

Rapport.



Monsieur Callisen chirurgien pensionnaire du Roi de Danne marc, membre du college des chirurgiens, & Licencié de la faculté de médecine à Copenhague; a envoyé trois observations, dont l'Académie m'a chargé de faire le Rapport.

La premiere est sur une fracture de l'occipital arrivé à un officier de marine, par la chute qu'il fit d'une hauteur d'environ quarante pieds. ce Blessé fut transporté comme mort, à l'hôpital Fredericien à Copenhague. Mr. Callisen qui suppléoit alors, le chirurgien en chef de cet hôpital; trouva que le Blessé étoit sans aucun sentiment, que le pouls & la Respiration étoient extrêmement faibles, qu'il s'étoit formé à la partie moyenne de l'occipital une tumeur qui surpassoit la grosseur d'un œuf de poule, que les extrémités ne faisoient pas le moindre mouvement, & que les urines

ARC 43 a. 11 bis

couloient involontairement. mr. callien fit faire trois saignées dans
la journée & donner plusieurs Lavements. Le lendemain mr. callien
fit une incision en croix sur la tumeur de l'occipital, & en explorant
la plaie avec le doigt, il trouva que le bord de l'os occipital
étoit fracturé & libre & qu'au dessous de ce bord, étoit une portion
osseuse qui sembloit estre poussée & arrêté sous cette portion supérieure.
ces circonstances ayant obligé d'agrandir considérablement la plaie,
en tous sens pour s'assurer de l'étendue & de l'état de la fracture:
on vit une fracture presque circulaire, de l'étendue d'un œuf de six
livres, une portion d'os, étoit glissée sous la partie supérieure de
l'occiput, & séparé par une fente large à peu près de deux lignes
de la partie inférieure. cette pièce sembloit fermement enchaîné &
inébriable. mr. callien détachait le périoste de toute la
circonférence supérieure de la fracture, qui y étoit assez fermement
adhérent. Les vaisseaux occipitaux coupés donnerent beaucoup
de sang, il ne s'y opposa qu'en pressant la plaie mollement jusqu'à
ce qu'elle fut prête pour l'opération du trepan, qu'il fit
en présence de messieurs le medecin & chirurgien ordinaires du
Roi, du directeur general de la chirurgie &c. &c.

monsieur callisen appliquait la premiere couronne a la
partie moyenne & superieure de l'occipital, tout pres du
bord antérieur duquel la piece fracture estoit enfoncée: il
tâchoit avec un elevatoire de repousser & elever cette piece,
mais en vain, c'est pourquoy il appliquait une seconde couronne
au costé droit, & une troisieme au costé gauche, a peu pres a
un demi pouce de la premiere, pour pouvoir agir avec
plusieurs elevatoires sur l'os enfoncé & le remettre a sa
place; y trouvant encor de la difficulté, il appliquait de
nouveau deux couronnes, entre les trois ouvertures seules
pour decouvrir entièrement le bord supérieur de la piece
enfoncée: apres quoy, il vint a bout de la remettre au
niveau du bord de la fracture, mais elle estoit, alors, si
vacillante qu'elle suivoit aisement le mouvement pulsatif
des arteres du cerveau. il otat une esquille de six lignes
de longueur & de trois de largeur, & avoit meme envie
d'oter la piece principale, mais les conseils des assistants
deciderent de la laisser en place. Les cinq couronnes
appliquées n'avoient formé qu'une ouverture qui offroit



à la vue quatre eminences tres pointus. il Les ôta avec un
instrument particulier, inventé par un mechanicien de nois,
[l'instrument qu'il se propose de presenter quelque jour à l'academie]
La dure mere étoit couverte d'une quantité de sang coagulé, dont
on tira une partie, le reste étant fortement attaché à la
surface. une petite bougie passoit librement à longueur d'un
pouce dans toute la circonférence de l'ouverture faite. La plaie
fut pansée mollement, Les symptomes ne diminuerent pas le jour
de l'operation, L'ouppissement le thargique & l'intermission
du pouls subsistoient toujours, L'urine sortoit involontairement,
& le ventre étoit constipé & gonflé. on lui fit une quatrième
saignée & on evacua par un lavement irritant, une quantité
d'excrements durs. Le lendemain de l'operation, & le troisième
jour après la blessure, Les symptomes sembloient estre un peu
calmes, Le malade commençoit à prononcer quelques mots avec
connexion, & à faire quelques mouvements des extremitez. Tout
l'appareil étoit mouillé d'une serosité rougeâtre, La portion de
La dure mere decouverte tres enflammée, & La piece offensee qui
avoit été déprimée étoit toujours tres vacillante. Les jours suivants

il s'établit une bonne & copieuse supuration, Le chirurgien
reprit peu à peu, sa couleur naturelle. Le huitième jour après
l'opération, Les bourgeons de chair commencent à pousser de tout
côté, ce qui donna à la pièce vacillante plus de fermeté. La plaie
fut toujours de mieux en mieux, Le malade avoit repris l'usage
de ses sens, Les excretions étoient à ses réglées mais il étoit toujours
dans une espèce d'assoupissement, & dans une insensibilité tout à fait
contraire à son humeur naturel dans l'état de santé. cela
continua jusqu'à la quatrième semaine après la Mesure.
on lui fit pendant ce tems plusieurs Remèdes, il fit encor
seigne cinq fois; deux du bras, deux des jugulaires & une fois
au pied selon l'état du pouls: Les minoratifs, Les Lavemens,
Les expectoriques & Les vesicatoires ne furent pas épargnées.
quatre semaines après l'opération, toutes les ouvertures étoient
Remplies de chair, La pièce osseuse qui avoit été déprimée, avoit
repris une entière fermeté, une lame très mince de La
table extérieure de cette pièce, & quelques esquilles du bord
des ouvertures fortées par l'application du trespas s'éloient
exfoliées & Le peau commençoit à se rapprocher au
centre de La plaie. dans La cinquième semaine, enfin
Le malade commençoit à reprendre peu à peu son



son humeur naturel, & a souffrir à regret la diete severe qu'on
lui prescrivait: il faisoit tous les mouvements du corps & des
extremitees avec une entiere liberte, mais ce fut alors aussi, qu'il
se plaignit, pour la premiere fois, de ne distinguer les objets
qu'imparfaitement. mr. callisen examina attentivement les yeux
du malade & trouva les prunelles tres dilatées, & se contractant
a peine d'un quart. mr. callisen dit qu'il mit en usage tout ce que l'art
prescrit pour debuire un accident si facheux, qu'il osa meme
electriser le malade a différentes reprises, mais que ce fut en vain.
La vue a thesse tres foible & le malade marche a peine sans guide.
pour la pleire, elle continuait d'aller de mieux, en mieux, & deux
mois apres, elle estoit parfaitement fermée par une cicatrice ferme
& tres enfoncée.

monsieur callisen demande 1^o. si la foiblesse de la vue de son
malade est un accident primitif ou consecutif de la fracture. 2^o. si
il doit estre attribué autant a la commotion, qu'a la compression du
cerveau. 3^o. s'il ne pourroit pas se faire qu'il ne fut que consecutif &
dû a la surabondance des sucs qui ont rempli les ouvertures faites
pour le trepan & qui ont fermé la piece osseuse qui avoit été déprimée; &

& si cette matiere ne pourroit pas avoir produit quelques
inegalités a la surface interieure du crâne, & faire une
compression sur le cerveau, trop foible pour troubler toute
l'economie animale, mais assez forte pour faire impression
au principe de l'organe de la vue; & si en supposant cela,
on ne pourroit pas oter ces inegalités par une seconde
trepanation, & s'opposer a leur regeneration par une diete
tres severe, plusieurs evacuations &c.

Sur ces demandes: nous pensons 1^o. que dans Le cas mentionné
La paralysie partielle des prunelles, est un accident primitif,
effet mediate de la compression, & immediate de la commotion
qui en s'étendant plus loin que la compression, & en se propageant
jusqu'à des fibrilles nerveuses d'une ténuité infinie & indicible
a produit La torsion & l'obliteration de la plus part d'entre
elles.

2^o. que l'électricité peut quelque fois guerir la paralysie
quand elle est produite par engourment dans quelques
principaux trunks de nerfs, mais que l'électricité n'est suivie
d'aucun succès quand La paralysie depend de l'obliteration
ou torsion de fibrilles nerveuses d'une ténuité infinie.



30. que Mr. Callisen feroit mal de trepaner de nouveau son malade dans l'espoir de trouver & de détruire quelques inégalités produites à la surface intérieure du crâne par la matière du cal, inégalités aux quelles il croit qu'on peut encor attribuer la paralysie de son malade. sa presumption ne nous paroit pas vraisemblable, car s'il existoit encor compression sur le cerveau, la paralysie des prunelles ne seroit pas le seul accident qui se manifesterait; & certainement la paralysie dont il est question n'est plus due à une compression subsistante, mais à l'oblitération des fibrilles nerveuses qui vont se distribuer aux iris ou prunelles.

Seconde observation.

un homme de campagne âgé de 36 ans d'une constitution Robuste, accoutumé à une manière de vivre fort laborieuse, fut attaqué au mois d'avril 1765, sans aucune cause manifeste, d'une fièvre fort vive jointe à une respiration fort gênée & à des douleurs Lancinantes qui avoient leur siege dans tout le côté droit de la poitrine & du bas ventre. L'urine étoit en petite quantité & le ventre constipé. Le malade se fiant à la vigueur de son tempérament ne voulut point faire de Remèdes. La fièvre qui étoit accompagnée de délire, & les autres symptômes continuèrent 15 jours sans diminution. apres ce tems. il eut un

un peu de calme, mais il Restoit toujours une douleur sourde
& pressante dans le côté droit de la poitrine, d'un appétit
& d'abattement des forces. cet état dura un mois, au bout
du quel tems les douleurs & les autres symptômes reparurent
avec plus de violence que jamais. enfin, apres deux mois de
souffrance, le malade prit le parti de se faire transporter
à copenhague, & d'entrer dans l'hôpital fredericien. mr. callisen
trouva ce malade dans un état à desespérer; il étoit moitié
assis, moitié couché, incliné vers le côté droit, il avoit la
respiration très difficile & le moindre mouvement augmen^{toit}
cette difficulté, le pouls étoit petit, outre cela le malade avoit
une ascite très décidée & un œdème des extrémités inférieures,
& du bras droit. d'après les détails peu circonstanciés que fit
la femme du malade de ce qui s'étoit passé, & surtout d'après
l'état présent, mr. callisen pensa qu'il y avoit eu une peripneu^{monie}
une peripneumonie qui s'étoit terminée par la rupture & que
le pénétration du pus, sur le diaphragme vers le suc droit
de la plèvre, causoit les accidens dont le malade étoit
accablé. mr. callisen examina attentivement l'extérieur de
la poitrine, & trouva que tout le côté droit, surtout vers la
partie inférieure étoit élevé: à quelque distance de



de l'aiselle, La tumeur étoit plus saillante, La couleur de la peau
un peu changee & on y sentoit une fluctuation bien marquée. m. calisen
L'edème qui empêchoit de distinguer Les côtes m. calisen jugeoit
par La situation & par la confrontation avec Le côté opposé que
c'étoit entre La seconde & La troisième des vrais côtes en comptant de
bas en haut que La fluctuation se manifestoit. L'état du malade
étoit trop pressant pour différer ce qui déterminat m. calisen à faire
L'opération de l'empyème deux heures après L'arrivée du malade. L'incision
des teguments & du muscle grand dentelé faite: une matière jaunâtre
en partie rougeâtre s'élançoit avec impétuosité, elle étoit fort fétide
& avoit déjà rongé La plèvre & Les muscles intercostaux. on agrandit
L'ouverture avec précaution pour faciliter L'introduction du doigt, &
Le coulement de La matière; il en sortit plus d'une chopine: L'air
entroit & sortoit avec un petit sifflement selon le mouvement de
La respiration qui étoit très faible. Le malade fut pansé mollement.
L'opération soulageoit peu, Les accidents subsisterent & La nuit fut
très mauvaise. Le lendemain L'appareil étoit innoyé de La matière
qui avoit coulé par la plaie, on fit une légère injection qui en
amena encore beaucoup. La respiration n'étoit néanmoins toujours
très difficile. m. calisen attribuoit La persévérance des accidents
à L'ascite qui quoiqu'un peu considérable L'avoit distinguée une

une induration sensible & se déterminat à faire La ponction:
il sortit à peu près quatre pintes d'eau rougeâtre, mêlé de
flocons purulents. Tous ces secours furent administré en vain
La Respiration étoit très difficile, Les angoisses augmentèrent
Les bords de La plaie se gangrenèrent & Le malade mourut
deux jours après L'opération.

Mr. Callisen fit L'ouverture du cadavre en présence de M^{rs}.
Les medecins & chirurgiens ordinaires du Roy.

L'ouverture de La poitrine faite: Mr. Callisen fut bien surpris
de ne point trouver de panchement, & de ce que Les pommons
étoient sans aucune ulceration: il trouva Le sac droit de La
plevre tellement accourci qu'il ne s'étendoit que jusqu'à La
quatrième des vrais côtes en devant & un peu plus bas en
arrière; ainsi L'incision faite, pour L'opération de L'empyeme
entre La cinquième & La sixième des vraies côtes, se trouvoit
un pouce & demi plus bas, que La partie La plus declive de
La poitrine. Le sac gauche de La plevre étoit presque comme
à l'ordinaire. Le lobe droit du pommom étoit très petit, flasque
& très adhérent à La plevre. Le pericarde contenoit à peu près
demi Livre de serum rougeâtre. Le cœur étoit grand & très
flasque. Le ventricule droit rempli de sang épumueux. Le
ventricule gauche étoit vuide. en examinant Les gros



~~Le tronc~~ Les gros vaisseaux, on trouva le tronc droit de l'artère
pulmonaire si petit, qu'on n'y introduisoit qu'avec peine une sonde
à femme: Les parois de ce vaisseau, n'excedoient pas, cependant,
leur épaisseur naturelle. L'artère pulmonaire gauche, au contraire
permettoit aisement l'introduction de deux doigts. Le foyer de débris
dont Mr. Cellisen avoit fait l'ouverture se trouva à la convexité
du grand lobe du foie, qui étoit tellement adhérent au diaphragme
et aux muscles intercostaux, que ces parties ne formoient qu'un seul
corps. La supuration avoit creusé dans la substance du foie une
cavité de la grandeur de deux poings qui contenoit encor quelques
onces de la matière évacuée par l'opération. Le foie d'un volume
très considérable ne débordoit, cependant, que très peu des côtes
et étoit monté dans la cavité de la poitrine en soulevant
le diaphragme. La vésicule étoit remplie d'une bile très fluide
et très peu de. Les trois canaux biliaires dans l'état naturel. Le
la Rate étoit racornie couverte de quelques taches blanches dures
comme de la corne. La cavité du bas ventre, contenoit encor
quelques livres d'eau rougeâtre, l'estomac et les intestins étoient
couverts de flocions purulents et parsemés de taches gangreneuses.

Les vaisseaux du cerveau étoient gorgés de sang, il y avoit beaucoup de sérosité dans les sinus et sur la base du crâne.

M^r. Callisen conclut de son observation, qu'il y a des cas où les grands abcès de la convexité du foie, ont quelque analogie avec les abcès de la poitrine, & qu'ils peuvent se présenter sous le masque d'un empyème: il fait remarquer que n'ayant pas eu l'occasion d'observer les premiers périodes de la maladie, la difficulté de respirer qui augmentoit considérablement quand le malade s'inclinoit du côté gauche, l'enrouement de la voix & le petit sifflement de l'air ex près l'opération, ont dû lui faire illusion. il fait voir que dans ce malade, le foie d'une grosseur énorme au lieu de descendre dans la cavité du bas ventre comme cela arrive ordinairement, étoit monté dans la poitrine jusqu'à la quatrième des vraies côtes. M^r. Callisen croit trouver la cause de cette prodigieuse ascension du foie dans le resserrement de l'artère pulmonaire droite, qui a dû nécessairement produire une espèce d'atrophie dans le poulmon. Le diaphragme ayant trouvé moins de résistance de la part de ce poulmon a cédé aisément à l'impulsion du foie augmenté de volume, l'inflammation de ce



ce viscere s'est communiqué au péritoine, au diaphragme, à la plèvre
à eux muscles intercostaux; On s'est ensuivi la cohésion intime de toutes
ces parties, ce qui a permis au jus de la substance du foie de se faire
jour entre la seconde & la troisième des vraies côtes sans se répandre
dans la cavité de la poitrine. Je ne s'admettre avec mr. callisen que
le fluxement de l'artere pulmonaire soit certainement la cause de
la l'rophie du p'oumon droit, & de la prodigieuse ascension du t'ye
mentionné dans son observation: nous convenons avec lui, que dans les
faits extrêmement rares il est très difficile de ne point se tromper
sur le diagnostic & sur le prognostic.

Troisième observation.

un étudiant en chirurgie, d'une constitution faible & délicate âgé de 28
ans, eut une tumeur fort dure au perinée à quelque distance de l'anus.
il cachait cet accident à son maître qui est chirurgien à copenhague, &
appliquait sur la tumeur des emplâtres résolutifs. La tumeur
augmentait de jour en jour, lui causoit des douleurs fort graves &
produisit strangurie. en fin la tumeur supura & la matière s'évacua
en quantité. Les symptômes diminuèrent & le malade se crut
presque hors d'affaire. quelques jours après il remarqua que
l'appareil étoit mouillé d'urine, il ne s'en inquiéta pas, esperant

que la cicatrisation de Labrès, étoit aussi celle de Luretre
il étoit intéressé. il passa quatre mois dans cette espérance,
pensant la plaie simplement, & ayant attention de tenir
une serviette au perinée pour recevoir une portion d'urine qui
se couloit par Labrès toutes les fois qu'il urinoit. ce jeune homme,
qui avoit toujours vaqué à ses affaires, inquiet en fin de la
continuation de tous les accidens demandoit Les conseils d'un
chirurgien de ses amis. ce chirurgien trouva Les bords de la
plaie durs & calleux, & decida qu'il falloit enlever profondément
Les bords de l'ulcere avant de pouvoir parvenir à une guérison
par suite. en effet, sans avoir la precaution de lui contracter
la sonde, il lui fit des incisions profondes & enleva toute la
circonférence de la plaie. Le malade souffrit beaucoup, & depuis
cette époque, L'urine qui étoit sortie avant ce tems, pour la
plus grande partie par la verge, couloit presque toute par
la plaie, & même quelques jours apres, il n'en sortoit absolument
plus que par la plaie. il passa encor quatre mois dans cet état
pendant lequel tems L'urine se fit aussi chemin par le
fistule, de sorte qu'elle sortoit en partie par la fistule au
perinée, en partie par l'anus, & point du tout par la verge.
La semence même, dans quelques pollutions nocturnes

sortit par la fistule. enfin le malade ne pouvant plus ni vaquer
à ses affaires, ni cacher son état vint à l'hôpital Frédéricien. Mr. Callisen
trouva que la fistule étoit distante de deux pouces, qu'elle étoit
calleuse, & garnie d'excroissances, qu'il y avoit dureté jusqu'au Rectum, &
qu'une grande cicatrice s'étendoit tout autour de la fistule: La sonde
& la bougie ne pénétoient que jusqu'au commencement du bulbe de
l'urethre, & à un pouce de distance de la fistule extérieure. à l'arrivée
du malade dans l'hôpital, il y avoit quatre mois qu'il n'étoit point sorti
d'urine par la verge. ces circonstances démontreroient 1^o. que la fistule
étoit dans la partie membraneuse de l'urethre, 2^o. que le col de la
vessie n'étoit point intéressé, 3^o. que l'urine s'étoit faite dans la
cellulose une route dans le Rectum, 4^o. qu'une portion de l'urethre
environné par le bulbe, & une portion de la partie membraneuse y
y jointe étoit fermement bouché, ou même détruite par les incisions
ou suppurations précédentes. Mr. Callisen ne perdit pas l'espérance
de rétablir le conduit naturel par une application assidue des bougies.
il introduisit la bougie trois ou quatre fois par jour, & faisoit prendre
au malade des Remèdes propres à corriger le vice de ses humeurs.
ce traitement fut continué pendant six semaines, mais en vain,

L'urine sortoit toujours par la fistule, & il n'en sortoit point
par la voie ordinaire. m^r callisen demanda une consultation.
& il y fut decidé de pratiquer l'application de Lei sonde, ou
en incisant le canal naturel, ou en faisant une nouvelle
communication avec la vessie. monsieur colpin chirurgien
de la cour voulut bien se charger de l'operation. il Lei fit
de la maniere suivante. apres une preparation convenable,
il fit mettre le malade dans la situation ordinaire pour
la taille, il introduisit une sonde canelée qui n'étoit pas fermée
à son bout, jusqu'à l'obstacle, il coupa Lei peau & les
graissees avec un bistouri plongea ensuite Lei pointe de
l'instrument dans la canelure de Lei sonde, incisa & continua
l'incision jusqu'à l'issue de la fistule. Le reste de l'operation
fut différé jusqu'à l'endemain pour mieux distinguer Lei
parties. on remit le malade dans la situation convenable
mais il ne fut pas possible malgré la perquisition la plus
exacte, de decouvrir le moindre vestige d'un canal entre l'endroit
ou l'obstacle étoit présenté à l'introduction de la sonde &
la fistule, ce qui faisoit Lei distance d'un pouce, Le bout de
Lei sonde sortoit facilement par l'incision de l'urethre



Le jour precedent. on introduisit alors, une sonde droite & creuse
par la fistule dans la vessie, & sur cette sonde on continua l'insertion
jusque dans le corps de la prostate, apres cela, on conduisit sur la
même sonde un calqui dans la vessie. on ne fit rien pour oter les
callosités, ny les excroissances dont les bords de la fistule étoient
garnies, ny pour l'ouverture qui communiquoit avec le Rectum, croyant
qu'en otant la cause, l'effet se détruiroit par ses seuls efforts de la
nature. La plaie fut pansée simplement, il ne sortoit que tres peu
d'urine par la plaie, les premiers jours qui suivirent l'operation, apres
ce tems, elle coula entièrement par la sonde. il s'établit une bonne
suppuration, & la partie convexe de la sonde se recouvroit tous les jours
de plus en plus par le rapprochement des boutons charnus. mr. callisen
laissa la sonde dans la vessie onze jours de suite, mais comme il
craignoit l'incrassation, il la Retiroit quelque fois un peu, & la
remettoit tout de suite. Le 12^{eme} jour mr. callisen ota la sonde qui
n'étoit point du tout incrustée, il en substitua une autre en forme d's.
croyant que le malade qui n'étoit pas beaucoup souffert de la sonde
ordinaire souffrirait encor moins de la sonde en s. mais le contraire

arrivait, & mr. callisen fut obligé de revenir à l'usage
de la sonde ordinaire. six semaines après l'opération, toutes
les duretés étoient entièrement fondries & la plaie au
perinée fermée par une cicatrice ferme, très profonde & enfoncée.
ce fut alors que mr. callisen commençait à ôter la sonde pendant
quelques heures par jour. trois mois après l'opération le
malade retenoit bien ses urines, les évacuoit en jet & avec
une entière liberté. cependant mr. callisen lui conseillait
de continuer encore quelque temps l'introduction de la sonde,
ce qu'il faisoit lui même avec beaucoup de facilité, pour
donner le tems à la portion du canal qui étoit relâchée,
d'acquiescer une entière fermeté, & pour prévenir le rétro-
cécement de cette partie.

il paroît dit mr. callisen par le détail de cette observation
qu'une partie de l'urètre a été entièrement détruite, & que
la compression continuelle des parties voisines par la sonde,
a contribué beaucoup à relâcher ce canal.

Je me mets avec mr. callisen qu'il y eût eu une partie



de l'urethre entierement de suite, nous pensons avec lui que la
portion de l'urethre qui estoit dure, gonflé & oblitéré a été rétablie
dans ses usages, par l'incision, l'effusion des sucs, & la pression
continue de la sonde.

Les observations de monsieur callisen nous paroissent bien faites,
& nous croyons que l'academie pourroit en faire usage.

Fait a paris Le treize avril mille sept cent soixante neuf

Courton